

Vodič za bolesnike i njegovatelje **FABHALTA** (iptakopan) ▼

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka FABHALTA u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Sažetak važnih rizika i preporučenih postupaka za njihovu prevenciju i/ili minimizaciju

- Liječenje lijekom FABHALTA može povećati rizik od ozbiljnih infekcija.
- Liječnik će Vas obavijestiti o cijepljenjima koja su potrebna prije liječenja i/ili o potrebi za primanjem antibiotske profilakse.
- **Obratite se svom liječniku ako primijetite bilo koji od znakova i simptoma ozbiljne infekcije** navedene u nastavku ovog vodiča i **odmah zatražite liječničku pomoć u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.**
- **Obavijestite svog liječnika prije nego što prestanete uzimati lijek FABHALTA.**
- **Ako propustite dozu, uzmite je čim možete, čak i ako je to blizu vremena za sljedeću dozu.**
- **Dobit ćete karticu sa sigurnosnim podacima za bolesnika. Karticu uvijek nosite sa sobom i obavijestite sve zdravstvene radnike koji Vas liječe da se liječite lijekom FABHALTA.**
- **Odmah prijavite bilo kakve nuspojave, uključujući infekcije.**

Ovaj vodič ne zamjenjuje uputu o lijeku koja se nalazi u svakom pakiranju lijeka. Molimo Vas da ovaj vodič pažljivo pročitate i sačuvate za buduće potrebe.

Uvod

Ovaj je vodič izrađen kako bi Vam pružio:

- osnovne informacije o lijeku FABHALTA i njegovom djelovanju
- važne sigurnosne informacije o primjeni lijeka FABHALTA

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi s ovim lijekom, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

Ordinirajući liječnik

Medicinska sestra

Vaša kartica sa sigurnosnim podacima za bolesnika

Kada Vam se prvi put propiše lijek FABHALTA, dobit ćete karticu sa sigurnosnim podacima za bolesnika.

Ova kartica veličine novčanika sadrži važne sigurnosne informacije o riziku od infekcije tijekom uzimanja lijeka FABHALTA i o tome što učiniti ako se pojave određeni znakovi ili simptomi.

Kartica sadrži i kontaktne podatke Vašeg liječnika ili bolnice za hitne slučajeve. Vaš liječnik će upisati kontaktne podatke na karticu.

Nosite ovu karticu uvijek sa sobom tijekom cijelog vremena liječenja lijekom FABHALTA i još dva tjedna nakon posljednje doze lijeka. Pokažite ovu karticu svakom zdravstvenom radniku uključenom u Vašu skrb kako bi znali da se liječite lijekom FABHALTA. To će im pomoći u dijagnosticiranju i pravilnom liječenju.

Ako niste dobili karticu sa sigurnosnim podacima za bolesnika, obratite se svom liječniku.

Kartica sa sigurnosnim podacima za bolesnika koji uzima lijek FABHALTA (iptakopan)▼

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

 **NOVARTIS**

verzija 1; rujan, 2026.

Vaš liječnik Vam je dodijelio i identifikacijski broj bolesnika kada Vam je prvi put propisan lijek FABHALTA.

Taj broj treba biti napisan na kartici.

Moj identifikacijski broj bolesnika



Što se nalazi u ovom vodiču?

O lijeku FABHALTA

str. 5

Kako uzimati lijek FABHALTA?

str. 6

S kojim važnim sigurnosnim rizicima trebam biti upoznat/a?

str. 7

Profilaktička cijepljenja i/ili liječenje antibioticima

str. 8

Prijavljivanje nuspojava

str. 9

Korisni pojmovi

str. 10

O lijeku FABHALTA

Što je FABHALTA?

FABHALTA je lijek koji se koristi u odraslih bolesnika za liječenje C3 glomerulopatije (C3G) zajedno s inhibitorom renin-angiotenzinskog sustava (RAS inhibitorom) ili samostalno ako RAS inhibitor ne djeluje dobro ili se ne može koristiti.

Što se događa u C3 glomerulopatiji?

U bolesnika koji imaju C3G sustav komplementa je prekomjerno aktivan, što dovodi do taloženja C3 unutar glomerula (dijela bubrega), a to uzrokuje upalu i oštećenje (ožiljke i zadebljanje tkiva). Zbog toga bolesnici s C3G-om često imaju visoke razine proteina u mokraći (proteinurija) i progresivno propadanje funkcije bubrega tijekom vremena.

Kako djeluje FABHALTA?

FABHALTA pripada skupini lijekova pod nazivom inhibitori komplementa koji djeluju tako da blokiraju dio imunološkog sustava koji se naziva „sustav komplementa”.

Djelatna tvar u lijeku FABHALTA, iptakopan, veže se na protein koji se naziva faktor B i dio je sustava komplementa te tako smanjuje naslage C3 u bubrezima. To pomaže smanjiti razinu proteina u mokraći i stabilizirati funkciju bubrega.

Kako uzimati lijek FABHALTA?

Preporučena doza je jedna kapsula (200 mg) dvaput na dan, jednom ujutro i jednom navečer. Kapsulu progutajte s čašom vode.

FABHALTA se može uzimati s hranom ili bez hrane.

Važno je ne zaboraviti nijednu dozu lijeka FABHALTA. Uzimanje lijeka FABHALTA svakoga dana u isto vrijeme pomoći će Vam da zapamtite kada trebate uzeti lijek. **Uzimajte lijek FABHALTA prema liječnikovim uputama** kako biste osigurali kontinuirano liječenje C3 glomerulopatije.

Nemojte prestati uzimati lijek FABHALTA ako prethodno niste o tome razgovarali sa svojim liječnikom.

Što ako zaboravim uzeti lijek FABHALTA?

Ako propustite jednu ili više doza, uzmite jednu dozu lijeka FABHALTA čim se sjetite (čak i ako je to neposredno prije sljedeće planirane doze), a zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Što ako uzmem previše lijeka FABHALTA?

Ako ste slučajno uzeli previše kapsula ili ako netko drugi slučajno uzme Vaš lijek, odmah se obratite svom liječniku.

S kojim važnim sigurnosnim rizicima trebam biti upoznat/a?

Rizik od infekcija

Lijek FABHALTA smanjuje sposobnost Vašeg tijela u obrani od infekcije, što može povećati rizik od ozbiljnih infekcija uzrokovanih određenim vrstama bakterija koje nazivamo inkapsulirane bakterije:

- bakterija *Neisseria meningitidis* - uzrokuje meningokoknu bolest, uključujući ozbiljnu infekciju moždanih ovojnica i krvi
- bakterija *Streptococcus pneumoniae* - uzrokuje pneumokoknu bolest, uključujući infekciju pluća, uha i krvi
- bakterija *Haemophilus influenzae* tipa b – uzrokuje ozbiljnu infekciju moždanih ovojnica, grkljana, pluća i krvi

Ove infekcije mogu se brzo pogoršati, postati opasne po život i dovesti do smrti ako se ne prepoznaju i ne počnu liječiti na vrijeme.

Znakovi i simptomi ozbiljne infekcije na koje trebate obratiti posebnu pozornost su:

- **Vrućica**
 - uz drhtavicu ili zimicu ili bez njih
 - uz glavobolju
 - uz osip
 - uz bolove u prsnom košu i kašalj
 - uz nedostatak zraka / ubrzano disanje
 - uz ubrzani puls
- **Glavobolja**
 - uz mučninu ili povraćanje
 - uz ukočeni vrat ili ukočena leđa
- **Zbunjenost**
- **Bolovi u tijelu sa simptomima nalik gripi**
- **Ljepljiva, znojna koža**
- **Oči osjetljive na svjetlost**

Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć u najbližoj zdravstvenoj ustanovi i obavijestite svog liječnika.

Ponesite sa sobom svoju karticu sa sigurnosnim podacima i pokažite je svakom zdravstvenom radniku koji je uključen u Vaše liječenje.

Profilaktička cijepljenja i/ili liječenje antibioticima

Cijepljenje smanjuje rizik od određenih ozbiljnih bakterijskih infekcija.

Liječnik koji Vas liječi obavijestit će Vas o cijepljenjima koja su Vam potrebna prije početka liječenja lijekom FABHALTA. Možda ćete trebati dodatno liječenje antibioticima za sprječavanje infekcije.

Cjepiva koja morate primiti prije liječenja lijekom FABHALTA su:

- **meningokokno cjepivo** (cjepivo protiv bakterije *Neisseria meningitidis*)
- **pneumokokno cjepivo** (cjepivo protiv bakterije *Streptococcus pneumoniae*)

Cjepivo koje ćete možda primiti prije liječenja lijekom FABHALTA:

- **cjepivo protiv bakterije *Haemophilus influenzae* tipa B**

Cjepiva Vas mogu zaštititi od ozbiljnih bolesti kao što su meningitis (upala moždanih ovojnica), upala pluća i sepsa (infekcija krvi). Potrebno je primiti više različitih cjepiva kako bi se osigurala što bolja zaštita od infekcija.

Čak i ako ste već bili cijepljeni, liječnik će Vam reći trebate li ponovno primiti isto cjepivo ili trebate li docijepljivanje prije početka liječenja.

Ova cjepiva morate primiti najmanje dva tjedna prije početka liječenja lijekom FABHALTA.

Ako to nije moguće, cijepit ćete se čim prije nakon što počnete uzimati lijek FABHALTA, a liječnik će Vam propisati antibiotike kako bi se smanjio rizik od bakterijskih infekcija.

Dobit ćete lijek FABHALTA samo ako Vaš liječnik potvrdi da ste primili odgovarajuća cjepiva i/ili antibiotike.

Liječnik će se pobrinuti da se prema potrebi ponovno cijepite. Imajte na umu da cjepiva smanjuju rizik od razvoja ozbiljnih infekcija, ali ih ne sprječavaju u potpunosti.

Prijavljivanje nuspojava

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, uključujući infekcije, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Korisni pojmovi

Blokatori receptora angiotenzina II (ARB-ovi)

Lijekovi koji pomažu opustiti vene i arterije kako bi se smanjio krvni tlak.

C3 glomerulopatija (C3G)

Rijetka bolest bubrega posredovana komplementom, u kojoj naslage proteina u bubrezima uzrokuju oštećenje.

Faktor B

Protein koji povećava aktivnost sustava komplementa.

Imunološki sustav

Složena mreža organa, stanica i proteina koja brani tijelo od infekcija i bolesti.

Inhibitori enzima koji konvertiraju angiotenzin (ACEi)

Lijekovi koji pomažu opustiti vene i arterije kako bi se smanjio krvni tlak.

Sustav komplementa

Dio imunološkog sustava koji pomaže u borbi protiv infekcije i uklanjanju oštećenih stanica.

Inhibitori komplementa

Lijekovi koji smanjuju aktivnost sustava komplementa, dijela imunološkog sustava.

Inhibitori renin-angiotenzinskog sustava (RAS)

Skupina lijekova kojima se liječe stanja poput visokog krvnog tlaka i zatajivanja srca blokiranjem djelovanja RAS-a, hormonskog sustava koji regulira krvni tlak i razine tekućine u tijelu.

Komponenta 3 komplementa (C3)

Protein u krvi koji ima ključnu ulogu u normalnom imunitetu.

Meningitis

Ozbiljna infekcija zaštitnih membrana koje okružuju mozak i kralježničnu moždinu (meninge), koja uzrokuje ukočen vrat, glavobolju i vrućicu.

Pneumonija / upala pluća

Ozbiljna infekcija jednog ili oba plućna krila.

Proteini

Velike molekule koje imaju različite uloge u tijelu, uključujući izgradnju i obnovu tkiva, enzima i hormona.

Proteinurija

Visoka razina proteina u mokraći

Sepsa

Infekcija krvi koja uzrokuje preopterećenje imunološkog sustava tijela i može biti opasna po život.



Kontakt podaci predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Novartis Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb

tel. 01/6274 220, novartis.hrvatska@novartis.com

Datum sastavljanja: 07.10.2026.

Broj odobrenja materijala: FA-11808473